



ERRATUM

카바페넴 내성 그람 음성균 감염의 항생제 치료

성균관대학교 의과대학 감염내과

위유미 · 강철인

Antimicrobial Therapy for Infections Caused by Carbapenem-Resistant Gram-Negative Bacteria

Yu Mi Wi and Cheol-In Kang

Division of Infectious Diseases, Department of Internal Medicine, Sungkyunkwan University School of Medicine, Seoul, Korea

Korean J Med 2018;93:439-446. <https://doi.org/10.3904/kjm.2018.93.5.439>

다음과 같이 본문 내 오류가 있어 수정합니다.

복잡성 요로감염과 복잡성 복강내 감염에서 metronidazole과 병합 치료로 승인을 받았으며 0.5-1.0 g을 매 8시간마다 투여하되 투여시 1시간 이상 투여해야 한다. 폐렴에 대한 고용량(2 g 매 8시간 투여) 치료효과에 대하여 3상 임상연구가 진행 중이다.

복잡성 요로감염과 복잡성 복강내 감염에서 metronidazole과 병합 치료로 승인을 받았으며 ceftolozane/tazobactam (1.0 g/0.5 g)을 매 8시간마다 투여하되 투여시 1시간 이상 투여해야 한다. 폐렴에 대한 고용량(2 g/1.0 g 매 8시간 투여) 치료효과에 대하여 3상 임상연구가 진행 중이다.